

### Contexto mundial

De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), a temporada epidêmica da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) continua com surtos em aves de granja, aves selvagens e mamíferos, principalmente nas regiões da Europa e América. No período epidêmico atual, o subtipo A(H5N1) é o predominante e têm provocado uma taxa alarmante de aves silvestres mortas e um número crescente de casos em mamíferos, tanto terrestres (incluindo animais de estimação) como aquáticos, causando morbidade e mortalidade. Embora afetem principalmente os animais, esses surtos representam riscos contínuos à saúde pública. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) recomendam que os países trabalhem de forma colaborativa e multissetorial para preservar a saúde animal e proteger a saúde humana (1,2,3).

A gripe aviária normalmente se espalha entre as aves, mas o aumento da detecção da gripe aviária A(H5N1) entre os mamíferos, que são biologicamente mais próximos dos seres humanos do que as aves, levanta preocupações de que o vírus possa se adaptar para infectar os seres humanos com mais facilidade. Desde 2020, uma variante do vírus da gripe aviária A(H5N1) pertencente ao clado H5 2.3.4.4b causou um número significativo de mortes em aves silvestres e aves domésticas em vários países da África, Ásia e Europa. Em 2021, o vírus se espalhou para a América do Norte e, em 2022, para as Américas Central e do Sul. Em 2023, vários países relataram surtos, principalmente nas Américas. Foram relatados vários eventos de morte em massa em aves selvagens causados pela cepa de vírus A(H5N1) clado 2.3.4.4b (3).

De acordo com o padrão sazonal histórico da IAAP<sup>1</sup>, a propagação é mais baixa em setembro, começa a aumentar em outubro e alcança seu ponto máximo em fevereiro. Portanto, a OMSA recomenda que os países mantenham e reforcem seus sistemas de vigilância, as medidas de biossegurança em granjas e continuem com a notificação oportuna de surtos de influenza aviária tanto em aves de granja como em espécies distintas (aves domésticas e/ou selvagens). A qualidade da vigilância é fundamental para a detecção precoce e a resposta oportuna às ameaças potenciais para a saúde animal com impacto na saúde pública humana (1,2,3).

Sempre que os vírus da gripe aviária circulam em aves, há um risco de infecções humanas esporádicas devido à exposição a aves infectadas ou a ambientes contaminados. De 2003 a 14 de julho de 2023, um total de 878 casos humanos de infecção por influenza A (H5N1), incluindo 458 mortes (taxa de letalidade de 52%), foram relatados à OMS em todo o mundo em 23 países (4).

---

<sup>1</sup> Os vírus da influenza aviária são classificados em vírus de influenza aviária de baixa patogenicidade (IABP) e vírus de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) de acordo com a sua capacidade de causar doenças em aves.

**Citação sugerida:** Organização Pan-americana da Saúde/ Organização Mundial da Saúde. Atualização Epidemiológica: Surto de influenza aviária causados por influenza A(H5N1) na Região das Américas. 9 de agosto de 2023, Washington, D.C.: OPS/OMS; 2023

## Resumo da situação na Região das Américas

Até a semana epidemiológica (SE) 31 de 2023, as autoridades de agricultura da Argentina, Bolívia<sup>2</sup>, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, os Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela<sup>3</sup> têm detectado surtos de IAAP A(H5N1) em aves domésticas, aves de granja e/ou selvagens e em mamíferos (**Tabela 1 e Tabela 2**). Entre os mamíferos identificados, as raposas vermelhas e os gambás foram os mais, frequentemente, afetados na América do Norte, e os lobos marinhos na América do Sul.

A detecção de surtos de IAAP em 15 países de América Latina e do Caribe é uma situação nunca registrada. Os surtos identificados localizam-se, principalmente, nas áreas da rota migratória do Pacífico (**Figura 1, Figura 2, Figura 3**). Até o momento e desde a introdução da influenza aviária A(H5N1) nas Américas em 2014, foram registradas três infecções humanas causadas pela influenza aviária A(H5N1): a primeira nos Estados Unidos da América notificada em 29 de abril de 2022 (5), a segunda no Equador, a qual foi notificada em 9 de janeiro de 2023 (6), e a terceira no Chile, a qual foi notificada em 29 de março de 2003 (7).

**Tabela 1.** Surtos de influenza aviária segundo tipo de animal afetado. Região das Américas, até a semana 31 de 2023

País	Aves selvagens	Aves de granja	Aves de quintal	Mamíferos
Argentina	Sim	Sim	Sim	
Bolívia (Estado Plurinacional da)	Sim	Sim	Sim	
Brasil	Sim		Sim	
Canadá	Sim	Sim	Sim	Sim
Chile	Sim	Sim	Sim	Sim
Colômbia	Sim		Sim	
Costa Rica	Sim			
Cuba	Sim			
Ecuador	Sim	Sim		
Estados Unidos da América	Sim	Sim	Sim	Sim
Guatemala	Sim			
Honduras	Sim			
México	Sim	Sim		
Panamá	Sim		Sim	
Peru	Sim	Sim	Sim	Sim
Uruguai	Sim		Sim	Sim
Venezuela (República Bolivariana da)	Sim			

Fonte: Dados reportados à OPAS pelos Pontos Focais Nacionais para o RSI ou disponíveis nos Ministérios e Institutos de Saúde dos países e territórios da Região.

<sup>2</sup> Estado Plurinacional de Bolívia


<sup>3</sup> República Bolivariana de Venezuela

**Tabela 2.** Mamíferos afetados por influenza aviária. Região das Américas, até a semana 31 de 2023

Mamíferos	Canadá	Chile	Peru	Estados Unidos da América	Uruguai
<i>Canis latrans</i> (Coioote)				Sim	
<i>Canis lupus familiaris</i> (Cão doméstico)	Sim				
<i>Cephalorhynchus eutropia</i> (Golfinho chileno)		Sim			
<i>Didelphis virginiana</i> (Gambá da Virgínia)				Sim	
<i>Enhydra lutris</i> (Nutria marina)		Sim			
<i>Felis silvestris catus</i> (Gato doméstico)				Sim	
<i>Felis silvestris catus</i> (Gato selvagem)	Sim			Sim	
<i>Lontra felina</i> (Chungungo)		Sim		Sim	
<i>Lynx rufus</i> (Gato montés)				Sim	
<i>Martes americana</i> (Marta)				Sim	
<i>Mephitis mephitis</i> (Skunk)	Sim			Sim	
<i>Nasua nasua</i> (Coatí sudamericano)					Sim
<i>Neovison vison</i> (Visón)	Sim				
<i>Otaria flavescens</i> (Leão-marinho)		Sim	Sim		
<i>Panthera leo</i> (Leão)			Sim		
<i>Panthera pardus</i> (Leopardo)				Sim	
<i>Panthera tigris</i> (Tigre)				Sim	
<i>Pekania pennanti</i> (Pekán)				Sim	
<i>Phoca vitulina / Halichoerus grypus</i> (Foca)	Sim			Sim	
<i>Phocoena spinipinnis</i> (Toninha espinhosa)		Sim			
<i>Procyon lotor</i> (Guaxinim)	Sim			Sim	
<i>Puma concolor</i> (Puma)				Sim	
<i>Tursiops truncatus</i> (Golfinho)			Sim	Sim	
<i>Ursus americanus / U. arctos horribilis</i> (Urso)	Sim			Sim	
<i>Vulpes vulpes</i> (Raposa)	Sim			Sim	

Fonte: Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA) (2023). Extraído em 4 de agosto de 2023. Dados extraídos e reproduzidos pela OPAS/OMS.

**Figura 1.** Surtos de influenza aviária e principais rotas migratórias de aves silvestres. Região das Américas, de novembro 2021 até 4 de agosto de 2023



**OPAS**

Organização Pan-Americana da Saúde  
 Organização Mundial da Saúde  
 Américas

© Organização Pan-Americana da Saúde-Organização Mundial da Saúde 2023. Todos os direitos reservados.  
 As designações utilizadas e a apresentação do material nestes mapas não implicam a expressão de qualquer opinião por parte da Organização Pan-Americana da Saúde a respeito da situação legal de qualquer país, território, cidade ou área ou de suas autoridades, ou a respeito da delimitação de suas fronteiras ou limites. As linhas pontilhadas e tracejadas nos mapas representam linhas fronteiriças aproximadas para as quais pode ainda não haver um acordo completo.  
 Fonte de dados - Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), République d'Haïti  
 Produção de mapas:  
 PAHO Health Emergencies Department (PHE)  
 Health Emergency Information & Risk Assessment (HIM)

- Surto de Influenza Aviária**  
 Novembro de 2021 a 4 agosto 2023
- Animal de criação ou doméstico
  - Animal silvestre
  - ▲ Caso humano

- Principais Rotas**
- Mississippi
  - Pacífico
  - Atlântico ocidental
  - Atlântico oriental

Fontes  
 - Dados: Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) (2023). Dados extraídos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Reproduzidos com permissão. A OMSA não se responsabiliza pela integridade ou exatidão dos dados aqui contidos, mas não se limita a qualquer exclusão, manipulação ou reformatação de dados que possam ter ocorrido fora de seu controle.  
 - Cartografia: Limites detalhados ADM0 da OMS; Conservação da Flora e Fauna Ártica - Serviço de Dados (SHP) Arquivo das principais rotas aéreas de aves árticas acessado em fevereiro de 2023.

Na sequência, é apresentado um resumo da situação em países da Região das Américas que notificaram surtos de influenza aviária em 2022 e 2023.

Na **Argentina**, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa) informou em 15 de fevereiro de 2023 a primeira detecção no país de gripe aviária A(H5) em aves selvagens, na lagoa de Pozuelos, a noroeste da província de Jujuy, perto da fronteira com a Bolívia (8). Até 14 de julho de 2023 101 focos de influenza aviária A(H5) foram confirmados em aves silvestres (7 surtos), aves de quintal (76 surtos) e de granjas de produção avícola (18 surtos) e 17 províncias do país: 24 em Buenos Aires, 21 em Córdoba, 12 em Neuquén, 9 em Santa Fé, 7 em Río Negro, 7 em Chubut, 4 em Chaco, 3 em Formosa, 2 em Entre Ríos, 2 em San Luis, 2 em La Pampa, 2 em Corrientes, 2 Santa Cruz, 1 em Jujuy, 1 em Santiago del Estero, 1 em Salta e 1 em Mendoza. Do total de focos detectados, 94 foram encerrados no país. Nenhum caso humano de infecção por influenza aviária A(H5) foi reportado em relação aos focos identificados (9,10,11,12).

Na **Bolívia**, em 27 de janeiro de 2023, o Serviço Nacional de Saúde Agrícola e Segurança Alimentar (SENASAG) notificou a identificação da gripe aviária A(H5) em uma granja de produção avícola no município de Sacaba, Departamento de Cochabamba (13). Até 23 de fevereiro, o SENASAG identificou 20 focos de influenza aviária A(H5N1) em municípios do Departamento de Cochabamba: 11 focos em granjas de produção avícola e 9 em aves de quintal, com mais de 218.000 aves abatidas até o momento. Além disso, em 18 de abril o SENASAG relatou um surto de influenza aviária no departamento de Potosí que foi controlado oportunamente pela autoridade de saúde no início do mês de março. Nenhum caso humano de infecção por influenza aviária A(H5) foi reportado em relação aos focos identificados (14)

No **Brasil**, em 15 de maio de 2023, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) relatou a primeira detecção de influenza aviária no país. Trata-se de 2 Trinta-réis-de-bando (*Thalasseus acutiflavus*), uma no município de Maratáizes e outra no município de Vitória, ambas no litoral do estado do Espírito Santo. Em 16 de maio, o MAPA relatou a identificação de uma terceira ave afetada, um atobá-pardo (*Sula leucogaster*) também no estado do Espírito Santo. Os casos foram detectados e reportados através do sistema de vigilância de animais silvestres estabelecido no Brasil. O estudo das amostras confirmou a gripe aviária A (H5N1) (15).

Até 3 de agosto de 2023, 74 focos de influenza aviária A(H5) foram confirmados em aves silvestres (72 focos) e aves de quintal (2 focos), distribuídos em 7 estados: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Até o momento, não foram detectados focos em aves de produção ou casos em humanos de infecção por influenza aviária (16).

No **Canadá**, até 28 de julho de 2023, foram registrados múltiplos surtos em aves de criação e em diferentes aves (incluindo aves selvagens) por IAAP A(H5N1) em nove das dez províncias desse país: Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland e Labrador, Nova Escócia, Ontário, Quebec e Saskatchewan. Entre as semanas epidemiológicas (SE) 28 e 30 de 2023, nenhum novo surto de IAAP foi detectado. Até 28 de julho de 2023, se estima que 7.668.000 aves em 9 províncias do país foram afetadas por influenza aviária de alta patogenicidade. Nenhum caso humano de infecção por influenza aviária foi registrado nos focos identificados até o momento (17,18).

No **Chile**, até o momento o Serviço Agrícola e Pecuário (SAG) detectou a presença de casos de IAAP (H5N1) distribuídos nas 16 regiões do país em 871 aves silvestres (em 50 espécies) e 75 aves de quintal (em galinhas, gansos, patos, perus). Ao mesmo tempo, a produção avícola foi afetada em 12 estabelecimentos industriais. Além disso, até 2 de agosto de 2023, o Serviço Nacional de Pesca e Agricultura (SERNAPESCA) detectou a gripe aviária A (H5) em 47 mamíferos aquáticos

(chungungo, golfinho chileno, leão-marinho, toninha, pinguim de Humboldt e huillin) em 13 regiões do país, com a maioria concentrada no norte (19-28).

Em 29 de março de 2023, um caso confirmado de infecção humana por influenza aviária A (H5) foi identificado no Chile, sendo o terceiro caso confirmado na Região das Américas. Corresponde a um homem de 53 anos de idade, residente na área costeira da região de Antofagasta, localizada no norte do Chile. O caso não tem histórico de comorbidades, viagens ou deslocamentos. Em 13 de março iniciou os sintomas e foi mantido em isolamento respiratório com ventilação mecânica sob controle multidisciplinar. Em 30 de junho de 2023, o paciente recebeu alta e retornou à sua comunidade de origem para uma reabilitação mais completa. Não foram identificados outros casos (7, 29-30).

Na **Colômbia**, até 5 de maio de 2023, o Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) identificou 49 surtos de IAAP A(H5N1) em aves de quintal (47 surtos) e em aves silvestres (2 surtos) em 7 departamentos do país: Bolívar (5 surtos), Cauca (1 surto), Chocó (7 surtos), Córdoba (22 surtos), Magdalena (1 surto), Nariño (8 surtos) e Sucre (5 surtos). O ICA informou que os dois surtos que ainda estavam ativos, ocorridos em fevereiro nos departamentos de Cauca e Nariño, foram encerrados. Em 18 de julho de 2023, o ICA identificou um novo foco de HPAI no município de Montería, departamento de Córdoba, em uma ave silvestre (pelicano marrom) da qual havia um total de 83 aves registradas, das quais 3 adoeceram e 1 morreu. Em 28 de julho de 2023, o ICA identificou o último foco de HPAI no município de Piendamó, departamento de Cauca, em uma ave silvestre (pelicano marrom) da qual havia um total de 34 aves registradas, das quais 1 adoeceu e 1 morreu. Até o momento, nenhum caso humano de infecção por influenza aviária A(H5N1) foi identificado nos surtos registrados (31-39).

Na **Costa Rica**, em 24 de janeiro de 2023, o Serviço Nacional de Saúde Animal (SENASA) reportou a detecção de quatro casos de Gripe Aviária A (H5) em aves aquáticas (Pelicanos Marrons), encontrados na praia de Cocles, em Puerto Viejo de Talamanca, província de Limón. Até 29 de março de 2023, o SENASA desse país detectou 14 surtos de influenza aviária, 13 surtos em aves silvestres nas províncias de Guanacaste, Limón e Puntarenas e um surto em aves de criação no cantão Parrita, província de Puntarenas. Em 6 dos focos detectados foi confirmada a neuraminidase N1. Até o momento, nenhum caso humano de infecção por influenza aviária A(H5N1) foi identificado nos surtos registrados (40, 41, 42, 43).

Em **Cuba**, em 7 de fevereiro de 2023, o Centro Nacional de Saúde Animal do Ministério da Agricultura de Cuba (CENASA) informou a detecção da influenza aviária A(H5N1) em aves silvestres pertencentes ao Jardim Zoológico de La Havana). Até o momento, nenhuma ave de produção avícola foi afetada e nenhum caso humano de infecção por influenza aviária A(H5N1) foi reportado em relação aos surtos identificados (44, 45, 46).

No **Equador**, até 28 de fevereiro de 2023, 17 surtos de influenza A(H5N1) foram identificados em granjas de produção avícola e aves de criação em 6 províncias do país: Azuay (1 surto), Bolívar (2 surtos), Cotopaxi (8 surtos), Imbabura (1 surto), Pichicha (1 surto) e Tungurahua (4 surtos) (42- 46). Em 30 de julho de 2023, um novo surto de influenza aviária foi identificado em uma fazenda comercial em Cotopaxi, detectado após 100 dias de ausência da doença (52).

Em 7 de janeiro de 2023, no Equador, uma infecção humana causada pela influenza A(H5N1) foi identificada em uma menina de 9 anos de idade, residente em uma área rural da província de Bolívar, que estava em contato com aves de criação adquiridas uma semana antes do início dos sintomas e que morreram sem causa aparente. Esta infecção humana por influenza aviária corresponde à segunda reportada na Região das Américas, e a primeira no Equador e na América Latina e Caribe. O caso foi detectado por meio da estratégia de vigilância sentinela para infecções respiratórias agudas graves. A paciente foi hospitalizada em uma unidade de terapia

intensiva pediátrica, foi mantida em isolamento, com tratamento antiviral e se recuperou completamente. Nenhum caso adicional foi identificado (6).

Nos **Estados Unidos**, desde o início de 2022 até 12 de julho de 2023, foram relatados surtos do vírus IAAP A(H5) em aves aquáticas selvagens, aves de granja comerciais, aves de criação e mamíferos. O sequenciamento genético preliminar e os testes RT-PCR em algumas amostras identificaram que esses vírus correspondem ao vírus IAAP A(H5N1) do clado 2.3.4.4. Durante o mesmo período, foram registrados surtos de IAAP em aves selvagens em 50 estados (1.027 condados) e em aves de granja em 47 estados (419 condados). 7.144 aves silvestres e mais de 58 milhões de aves de granja foram afetadas devido aos surtos identificados e controlados. Com relação aos surtos identificados em mamíferos, até 12 de junho 198 casos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) A(H5N1) foram identificados em mamíferos, em 26 estados do país. Entre os mamíferos afetados, 42% correspondem às raposas vermelhas (*Vulpes vulpes*), 15.6% são gambás (*Mephitis mephitis*), 8% são focas (*Phoca vitulina*) e 10% são onças-pardas (*Puma concolor*) (53, 54).

Em 28 de abril de 2022, foi identificado nos Estados Unidos um caso humano de infecção por influenza A(H5N1) em uma pessoa envolvida no abate de aves em uma instalação avícola comercial no Colorado, onde se detectou o vírus da influenza A(H5N1) em aves. Este foi o segundo caso humano associado a este grupo específico de vírus H5 que, atualmente, são predominantes, e o primeiro caso nos Estados Unidos. O paciente foi isolado e tratado com antivirais, não necessitou de hospitalização e se recuperou completamente. Neste evento, nenhum caso adicional foi identificado, nem houve evidência de transmissão de humano para humano do vírus da influenza A (H5N1) (5).

Na **Guatemala**, em 14 de fevereiro de 2023, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Alimentação (MAGA) informou a identificação da influenza aviária A(H5N1) em aves silvestres aquáticas (Pelicanos Marrons), no município de Puerto Barrios, departamento de Izabal. Nenhum caso foi relatado entre aves domésticas ou de granja e nenhum caso humano de infecção por influenza aviária A(H5N1) foi registrado nos surtos identificados (55, 56).

Em **Honduras**, em 4 de janeiro de 2023, o Serviço Nacional de Saúde e Segurança Agroalimentar (SENASA) relatou a identificação da influenza aviária A(H5N1) em aves silvestres aquáticas (pelicanos marrons) encontrada na cidade de La Ceiba, Departamento de Atlántida e no município de Puerto Cortés, departamento de Cortés. Nenhum caso foi relatado entre aves domésticas ou aves de granja e nenhum caso humano de infecção por influenza aviária A(H5N1) foi relatado nos surtos identificados (57, 58, 59).

No **México**, entre outubro e dezembro de 2022, o Serviço Nacional de Saúde, Inocuidade e Qualidade Agroalimentar (SENASICA) identificou 50 surtos de influenza aviária de alta patogenicidade A (H5N1) em aves de criação, granjas e aves silvestres, em 13 estados do país: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado do México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas e Yucatán, com um total de 5,9 milhões de aves afetadas (54-56). Para o ano de 2023, em 2 de março, SENASICA informou a identificação do vírus da influenza aviária A (H5N1) em três granjas de produção avícola nos municípios de Asientos e Rincon de Romos, no Estado de Aguascalientes (57). Até o momento, nenhum caso humano de infecção pela influenza aviária A (H5N1) foi registrado nos surtos identificados (60-63).

No **Panamá**, em 20 de dezembro de 2022, o Ministério de Desenvolvimento Agrícola (MIDA) confirmou a detecção da IAAP A(H5N1) em um pelicano encontrado a 32 quilômetros da Cidade do Panamá, na costa do Arquipélago de Las Perlas, no Golfo do Panamá (58). Até 14 de abril, 43 casos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) A(H5N1) foram identificados em aves aquáticas silvestres e aves de criação em 4 províncias do país: Colón, Panamá, Panamá Oeste e Veraguas, nenhuma ave de produção avícola foi afetada e nenhum caso humano de infecção

por influenza aviária A(H5N1) relacionados com os focos identificados. Também foram registrados 2 casos em animais selvagens, de espécies não identificadas (65-66).


No **Perú**, até 26 de julho de 2023, foram confirmados 223 casos de influenza aviária A(H5), dos quais 51 correspondem às aves silvestres, 143 às aves de criação. Também foram confirmados casos em 12 mamíferos. Os casos em aves silvestres e aves de quintal foram identificados em 17 departamentos: Cajamarca (43 casos), Lambayeque (70 casos), Lima (27 casos), La Libertad (14 casos), Ica (19 casos), Piura (12 casos), Ancash (9 casos), Apurímac (6 casos), Arequipa (5 casos), Amazonas (4 casos), Tacna (3 casos), Junín (2 casos), Ayacucho (2 casos), Callao (1 caso), Moquegua (2 casos), Ucayali (1 caso) e Tumbes (3 casos). Os casos em mamíferos ocorreram em 5 departamentos: Lima (3 casos), Piura (1 caso), Junín (1 caso), Arequipa (1 caso), Ica (6 casos), 83 % dos casos em mamíferos correspondem a leões marinhos (*Otaria flavescens*). Até o momento, nenhum caso humano de infecção por influenza aviária A(H5N1) foi detectado nos surtos identificados (67-72).

No **Uruguai**, em 15 de fevereiro de 2023, o Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP) detectou um surto de influenza aviária A(H5) em aves selvagens (Cisnes de Pescoço Negro) na área de fronteira entre os departamentos de Maldonado e Rocha, afetando 100 cisnes. Até 7 de julho foram confirmados seis focos de influenza aviária A(H5), em um total de 162 aves de quintal. Até o momento, nenhum caso humano de infecção por influenza aviária A(H5N1) foi detectado nos surtos identificados (73-76).


Na **Venezuela**, em 29 de novembro de 2022, o Ministério do Poder Popular para a Agricultura Produtiva e Terras, como resultado das atividades de inspeção e vigilância epidemiológica, identificou um surto de IAAP em pelicanos em Puerto Piritu, Estado de Anzoátegui, no qual 172 aves aquáticas silvestres foram afetadas. Os estudos moleculares detectaram o vírus da Influenza A(H5), sendo esta a primeira vez que IAAP foi detectada na Venezuela. Posteriormente, o Instituto Venezuelano de Pesquisa Científica (IVIC) confirmou o diagnóstico completando a caracterização do vírus como A(H5N1). Até o momento, nenhum caso humano de infecção por influenza aviária A(H5N1) foi detectado no surto identificado (7, 78, 79).



**Figura 2.** Surtos de influenza aviária e principais rotas migratórias de aves silvestres. Região das Américas, março de 2007 a outubro de 2021 e novembro de 2021 a 4 de agosto de 2023.



**Figura 3.** Surtos de influenza aviária e principais rotas migratórias de aves silvestres. Região das Américas, dezembro de 2022 a 4 de agosto de 2023



**OPAS**



© Organização Pan-Americana da Saúde-Organização Mundial da Saúde 2023. Todos os direitos reservados.  
 As designações utilizadas e a apresentação do material nestes mapas não implicam a expressão de qualquer opinião por parte da Organização Pan-Americana da Saúde a respeito da situação legal de qualquer país, território, cidade ou área ou de suas autoridades, ou a respeito da delimitação de suas fronteiras ou limites. As linhas pontilhadas e tracejadas nos mapas representam linhas fronteiriças aproximadas para as quais pode ainda não haver um acordo completo.  
 Fonte de dados: - Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), République d'Haïti  
 Produção de mapas: PAHO Health Emergencies Department (PHE) Health Emergency Information & Risk Assessment (HIRA)

Surto de Influenza Aviária

Tipo de animal

- Aves de capoeira ou aves domésticas
- Aves selvagens
- ▲ Mamíferos

Principais rotas

- Mississippi
- Pacífico
- Atlântico ocidental
- Atlântico oriental



Fontes

- Dados: Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) (2023). Dados extraídos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Reproduzidos com permissão. A OMSA não se responsabiliza pela integridade ou exatidão dos dados aqui contidos, mas não se limita a qualquer exclusão, manipulação ou reformatação de dados que possam ter ocorrido fora de seu controle.
- Cartografia: Limites detalhados ADM0 da OMS; Conservação da Flora e Fauna Ártica - Serviço de Dados (SHP) Arquivo das principais rotas aéreas de aves árticas acessado em fevereiro de 2023.

## Recomendações para os Estados-Membros

Tanto o vírus de IAAP como os IABP podem se espalhar rapidamente entre as aves de criação, por meio do contato direto com aves silvestres ou outras aves de criação infectadas, ou por meio do contato direto com fômites ou superfícies ou água contaminada com os vírus. A infecção de aves de criação por vírus de IAAP pode provocar uma doença grave com alta mortalidade. Os vírus IABP estão mais associados à infecção subclínica. Os termos IAAP e IABP aplicam-se apenas à sintomatologia em aves (galinhas em particular) e ambos os tipos de vírus têm o potencial de causar infecções graves em humanos.

Os casos humanos estão relacionados com o contato próximo com aves infectadas e ambientes contaminados. Esses casos têm sido cuidadosamente avaliados e, até o momento, não há evidências de propagação entre humanos. Em geral, o risco para a saúde humana é baixo, mas é necessário manter e reforçar a vigilância.

Os países são incentivados a trabalhar de forma colaborativa e multissetorial para preservar a saúde animal e proteger a saúde humana. É essencial implementar medidas preventivas contra a gripe aviária na origem, estabelecer protocolos para detecção, notificação e resposta rápida a surtos em animais, fortalecer a vigilância da gripe animal e humana, conduzir investigações epidemiológicas e virológicas em relação a surtos em animais e infecções humanas, compartilhar informações genéticas sobre vírus, promover a colaboração entre os setores de saúde animal e humana, comunicação de riscos eficaz e assegurar a preparação para uma possível pandemia de influenza em todos os níveis.

### Coordenação intersetorial

O controle da doença em animais é a primeira medida para reduzir o risco para os seres humanos. Por isso, é importante que as ações de prevenção e controle, tanto no setor animal como na saúde humana, sejam realizadas de forma coordenada e organizada. Será necessário estabelecer e/ou fortalecer mecanismos ágeis de troca e análises em conjunto das informações para facilitar a tomada de decisões de maneira coordenada.

A implementação de um programa de vigilância abrangente, incluindo aves silvestres e aves de granjas, tanto de criação quanto comerciais, é essencial. É preciso combinar as estratégias de vigilância direcionadas baseadas em risco com um fortalecimento da vigilância global. A esse respeito, as tarefas de conscientização dos agentes de saúde são fundamentais, particularmente em granjas, para incentivar a detecção e notificação de eventos suspeitos. Esses programas também fornecem informações que permitem modelar a propagação e realizar análises de risco mais precisas.

As recomendações completas para fortalecer o trabalho intersetorial de vigilância, detecção oportuna e investigação de eventos de influenza na interface homem-animal estão disponíveis em: <https://bit.ly/3UQrg4d>

### Comunicação de riscos e envolvimento da comunidade

A comunicação de riscos é um componente fundamental da preparação e resposta às emergências de saúde, especialmente aquelas emergências com potencial pandêmico ou epidêmico. Uma comunicação oportuna e transparente junto às populações, bem como a emissão de mensagens claras sobre os comportamentos e medidas preventivas a serem adotadas pelas comunidades é vital para reduzir a transmissão. Além disso, uma comunicação de risco adequada contribuirá para reduzir os rumores, mitos e desinformação relacionados ao surto e permitirá que as populações tomem decisões acertadas para reduzir o risco de contágio.

Vale ressaltar que a comunicação de riscos em emergências de saúde está integrada por diversos aspectos e áreas e inclui, mas não se limita a, comunicação institucional ou com a mídia, por isso é importante que se estabeleça claramente quem são os responsáveis ou equipes nas autoridades de saúde que liderarão de forma integral os aspectos técnicos relacionados com este componente.

A Organização Pan-Americana da Saúde recomenda, aos Estados membros, as seguintes ações entre suas medidas de preparação para a comunicação de riscos em caso de um eventual surto de influenza aviária:

- Delegar a uma pessoa ou equipe responsável por comunicação de riscos para revisar os planos ou estratégias existentes de comunicação de riscos em contextos pandêmicos ou epidêmicos e fazer os ajustes ou atualizações necessárias para fortalecer os preparativos e responder a um eventual surto. Você pode ver as orientações recentes da OMS sobre um plano de comunicação de risco para doenças respiratórias no seguinte link, em inglês: <https://bit.ly/3GTSKAr>
- Coletar informações existentes e/ou realizar avaliações qualitativas e/ou avaliações quantitativas rápidas para conhecer as características das comunidades de maior risco, padrões e canais de comunicação, idioma, religião, pessoas influentes. Essa informação é vital para poder formular ações de preparação e resposta adequadas para a comunicação de riscos.
- Construir confiança por meio de comunicação oportuna, transparente e com transmissão em várias plataformas, métodos e canais. Para manter a confiança da população, também é fundamental comunicar mesmo em meio à incerteza, esclarecendo o que se sabe e o que ainda não se conhece.
- Identificar comunidades para trabalhar as ações de comunicação de risco e permitir que elas participem de sua implementação, para garantir que as intervenções sejam colaborativas e que a comunidade se aproprie dos processos de comunicação. O envolvimento da comunidade contribuirá para a adoção de comportamentos preventivos.
- Emitir mensagens ao público sobre identificação de sintomas e prevenção, particularmente a populações com maior potencial de exposição ao vírus: ambientes rurais, agricultores, trabalhadores agrícolas, proprietários de aves de criação. As mensagens devem ser transmitidas nos canais e através das plataformas consultadas por cada tipo de público.
- Ativar a escuta social de rumores e desinformação através de plataformas digitais e outros canais de troca de informação relevantes (linhas telefônicas diretas, portais web, etc.), para responder a possíveis mensagens falsas que circulem entre o público e adaptar as mensagens de acordo com as necessidades detectadas por esse monitoramento.

No caso específico da influenza aviária, uma estratégia de comunicação intersetorial é essencial, abordando mensagens-chave que informem sobre o potencial risco e as precauções do ponto de vista da saúde pública, incluindo a quem contatar em caso de suspeita ou contato. Também é necessário que se tenha conhecimento da doença do animal, de sua apresentação clínica e da via de comunicação com as autoridades veterinárias. Deve-se considerar a possibilidade de diferenciar a estratégia de comunicação de acordo com o público (por exemplo, produtores

pecuários, proprietários de granjas, cidadãos comuns, atores envolvidos com a fauna silvestre etc.).

## Vigilância em humanos

As pessoas em risco de infecção são aquelas direta ou indiretamente expostas a aves infectadas (domésticas, selvagens ou em cativeiro), por exemplo, os criadores de aves de granja que mantêm contato próximo e regular com aves infectadas ou durante o abate ou na limpeza e desinfecção das granjas afetadas. Por essa razão, recomenda-se o uso de equipamentos de proteção individual adequados e de outras medidas de proteção para evitar a transmissão zoonótica nesses operadores.

A fim de identificar de forma oportuna casos ou eventos de transmissão na interface homem-animal, é recomendada a vigilância e o monitoramento de pessoas expostas. Devido à natureza em constante evolução dos vírus da influenza, a OPAS/OMS continua a enfatizar a importância de reforçar a vigilância da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e a vigilância da síndrome gripal (SG) para detectar alterações virológicas, epidemiológicas e clínicas associadas aos vírus da influenza circulantes que podem afetar a saúde humana. Além das atividades de busca ativa de casos, identificação e rastreamento de contatos realizadas durante a investigação epidemiológica de eventos zoonóticos, é aconselhável reforçar os sistemas de vigilância existentes para SRAG e SG onde as granjas avícolas estão localizadas, onde os casos residem, onde ocorrem surtos de animais ou onde se suspeita estar a fonte de infecção. Para complementar a vigilância da SRAG e da SG, a OPAS/OMS recomenda estabelecer sistemas de alerta oportuno para fornecer panorama mais completo da situação e realizar oportunamente uma avaliação de riscos conjunta e coordenada entre os setores humano e animal.

Ao se detectar uma infecção humana, a imediata notificação é essencial para uma investigação e implementação de medidas apropriadas, incluindo isolamento e tratamento do caso em tempo oportuno, busca ativa de outros casos associados ao surto, assim como identificação de contatos próximos para gerenciamento e acompanhamento adequados (74).

Recomenda-se que os setores de saúde humana e animal trabalhem conjuntamente na análise de risco na interface homem-animal de forma que a equipe de saúde possa ser alertada sobre áreas onde a transmissão da influenza aviária (IAAP ou IABP) está ocorrendo em aves e onde há maior probabilidade de ocorrência de infecção em humanos expostos a esses vírus.

A OPAS/OMS reitera aos Estados Membros a necessidade de manter e reforçar a vigilância dos vírus da influenza sazonal e zoonótica, incluindo o envio imediato de amostras de influenza humana causada por influenza aviária para o Centro Colaborador da OMS nos CDC dos Estados Unidos.

Uma vez que as informações sobre a circulação do vírus da influenza aviária A(H5N1) são importantes para a composição da vacina contra a influenza humana e para gerar dados de preparação e resposta, recomenda-se aos países compartilharem amostras de influenza animal com o Centro Colaborador da OMS do Hospital Infantil St. Jude, que se concentra exclusivamente na ameaça que os vírus de influenza zoonótica representam para os seres humanos.

## Investigação de caso

Em caso de confirmação ou suspeita de infecção humana causada por um vírus da influenza com potencial pandêmico, incluindo um vírus aviário, recomenda-se que:

- Deve ser realizada uma investigação epidemiológica exaustiva da história da exposição a animais, viagens e contatos doentes. A investigação não deve ser adiada, mesmo que sejam aguardados resultados laboratoriais confirmatórios.
- A investigação epidemiológica deve incluir a identificação oportuna de eventos respiratórios inusuais, que possam sinalizar a transmissão de novo vírus de pessoa para pessoa.
- As amostras clínicas coletadas no momento e no local em que ocorreu o caso devem ser testadas e enviadas ao centro colaborador da OMS, para sua caracterização dentro da primeira semana de detecção.
- Sempre devem-se aplicar procedimentos padrão de prevenção e controle de infecções (PCI) e procedimentos padrão de precaução, e equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados ao risco (de acordo com os modos de transmissão mais prováveis) devem ser utilizados para proteger a saúde dos investigadores. Os EPIs devem ser utilizados quando em contato com pessoas sintomáticas e em situações em que haja suspeita de transmissão de humano para humano.
- A investigação epidemiológica deve incluir informações dos serviços veterinários oficiais e do setor privado (produção animal) sobre a origem dos animais e sobre registros de deslocamentos dentro e fora das instalações. Essa informação ajudará a definir a abrangência (localização) da investigação em seres humanos expostos a animais infectados.
- As informações dos serviços veterinários poderiam orientar sobre possíveis episódios de influenza (comunicáveis e não comunicáveis) que ocorram no território e nas granjas relacionadas com o evento.
- Para mais informações sobre a investigação de casos de influenza não sazonais, o "Protocolo para Investigação de Influenza Não Sazonal e Outras Doenças Respiratórias Agudas Emergentes" da Organização Mundial da Saúde está disponível em espanhol em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/329895>

### Notificação de casos em seres humanos

1. Um **caso confirmado** de infecção humana com influenza aviária deve ser relatado **imediatamente** através de dois canais: ao Ponto de Contato Regional da OMS para Regulamentos Sanitários Internacionais (IHR) ([ihr@paho.org](mailto:ihr@paho.org)) por meio do Ponto Focal Nacional do IHR, e ao Sistema Global de Vigilância e Resposta à Influenza da OMS (GISRS) administrado pela OPAS e OMS ([flu@paho.org](mailto:flu@paho.org)). O relatório deve incluir todos os resultados disponíveis da investigação epidemiológica do caso e as características virológicas do vírus.
2. Um caso suspeito de infecção humana com influenza aviária deve ser relatado **imediatamente** ao GISRS ([flu@paho.org](mailto:flu@paho.org)), e as informações sobre o caso suspeito podem ser compartilhadas com o Ponto de Contato Regional da OMS para IHR ([ihr@paho.org](mailto:ihr@paho.org)), pois este é um evento incomum. O relatório deve incluir todos os resultados disponíveis da investigação epidemiológica do caso e as características do vírus.

### Vacinação contra a influenza sazonal no contexto da influenza aviária (75,76)

- Embora a vacina contra a influenza sazonal não proteja contra a influenza A(H5) zoonótica, ela contribui para reduzir o risco de coinfeção e recombinação genômica dos vírus aviários e humanos, que podem resultar em novas cepas com potencial pandêmico.
- A OMS recomenda a vacinação contra a influenza sazonal em pessoas com risco de infecção pelo vírus da influenza A (H5), especialmente em áreas com circulação da

influenza aviária. Entre os grupos de alto risco de infecção por influenza A (H5) encontram-se as pessoas que estão em contato próximo com animais, incluindo aves de granjas, em áreas onde se sabe que há circulação da influenza aviária. Esta recomendação se aplica aos trabalhadores da indústria avícola, ao pessoal dos serviços veterinários envolvidos em tarefas de vigilância e controle de doenças, bem como às pessoas que possam estar em contato com aves silvestres, aos trabalhadores de centros de atendimento a animais silvestres e àqueles que, no campo, realizam tarefas que envolvam o manuseio desses animais.

- A vacinação com vacinas contra a influenza sazonal deve ser usada em combinação com outras medidas de controle, como medidas de prevenção e controle de infecções e o uso de equipamentos de proteção individual, para reduzir o risco de infecção por influenza aviária nessas populações.
- Existem algumas vacinas de **uso humano** contra a influenza aviária A(H5) autorizadas, mas seu uso está restrito. Como o risco de infecção humana permanece baixo, a OMS não recomenda a vacinação da população com essas vacinas no período interpandêmico.

## Diagnóstico laboratorial em humanos

### Coleta de amostras humanas

As amostras devem ser coletadas por pessoal treinado, em conformidade com todas as normas de biossegurança, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para vírus respiratórios.

As amostras recomendadas são do mesmo tipo de amostras utilizadas para a vigilância de rotina da influenza. O swab nasofaríngeo é o método ideal de coleta de amostras para o teste de influenza. No entanto, uma amostra combinada de swab nasal e faríngeo ou amostras de aspirado podem ser coletadas. Deve-se utilizar um swab estéril de dacron/nylon para a coleta de amostras. Os swabs com ponta de algodão e de madeira não são recomendados, pois interferem no processamento da amostra e inibem as reações de diagnóstico molecular. Os swabs devem ser colocados num tubo de transporte viral estéril contendo 3 ml de meio de transporte viral e transportados no mesmo tubo com meio de transporte viral (MTV).

É recomendada a coleta de amostras dentro de 4 dias após o início dos sintomas, para se obter o mais alto desempenho do vírus da influenza e uma melhor detecção. A coleta de amostras em contatos assintomáticos não é recomendada, a menos que se considere necessário, em conformidade com diretrizes nacionais.

As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8 °C) e enviadas para o laboratório (laboratório central, nacional ou de referência), onde devem ser processadas nas primeiras 24-72 horas após a coleta. Se as amostras não puderem ser enviadas dentro deste período, recomenda-se congelar a -70 °C (ou menos) até que as amostras sejam enviadas (assegurando a manutenção da cadeia de frio).

### Fluxo de amostras e algoritmo de testes laboratoriais

Nas Américas, todos os centros nacionais de influenza (NICs) e laboratórios nacionais de referência (LNRs) para influenza humana, como parte do Sistema Global de Vigilância e Resposta à Influenza da OMS (GISRS), usam protocolos de diagnóstico molecular e reagentes desenvolvidos e validados

pelo Centro Colaborador da OMS nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).

Quando forem identificados casos suspeitos de infecção humana causada pela influenza aviária A/H5, deve ser colhida uma amostra respiratória que seja encaminhada a um NIC ou a um LNR para análise (**Figura 4**) (77).


As amostras colhidas de casos humanos suspeitos, expostos a aves ou seres humanos infectados com influenza aviária A/H5, devem ser testadas para detecção de influenza. Amostras positivas para influenza A devem ser subtipadas posteriormente para H5 (**Figura 5**).

**Figura 4.** Fluxo de amostras de casos suspeitos de Influenza A/H5 em unidades sentinelas e laboratórios descentralizados.





Figura 5. NIC analizando amostras de casos suspeitos de influenza A/H5 (78,79)



## Reativos laboratoriais

Os kits do CDC-EUA para detecção em tempo real da reação em cadeia de polimerase com transcriptase reversa (qRT-PCR) dos vírus da influenza estão disponíveis através do *International Reagent Resource* (IRR).

Para a detecção e subtipagem da influenza A/H5, estão disponíveis os seguintes kits e controles para detecção molecular:

- Influenza SARS-CoV-2 Multiplex Assay (RUO) (500 reactions) (Catalog No. FluSC2PPB-RUO), dried primers and probes
- Influenza SARS-CoV-2 Multiplex Assay Positive Controls Kit (RUO) (500 reactions) (Catalog No. FluSC2PC-RUO)
- CDC Real-Time RT-PCR Influenza Virus A/H5 (Asian Lineage) Subtyping Panel (VER 4) (RUO) (Catalog No. FluRUO-13)
- CDC Influenza A/H5N1 (Asian Lineage) Real-Time RT-PCR Positive Control with Human Cell Material (RUO) (Catalog No. VA2715)

## Interpretação dos resultados

Os marcadores (alvos) para kits CDC para influenza A/H5 subtipo são os seguintes: INFA (M), H5a (HA), H5b (HA) e RP.

Ao usar o kit de subtipagem de influenza CDC A/H5:

- Amostras positivas para os marcadores INFA, H5a e H5b são consideradas **positivas para influenza A/H5**.
- Amostras positivas para um único marcador H5 são **presuntivas para influenza A/H5**.

Em ambos os casos, as amostras devem ser enviadas para um Centro Colaborador da OMS para posterior caracterização ou confirmação (no caso de resultados presuntivos). No entanto, uma amostra positiva para influenza A/H5 (ambos marcadores positivos) deve ser relatada imediatamente.

A OPAS está atualmente trabalhando para apoiar os Estados Membros na preparação e resposta à influenza A/H5. Para obter assistência adicional, entre em contato com [flu@paho.org](mailto:flu@paho.org).

## Envio de amostras

O CDC-EUA é o Centro Colaborador designado pela OMS na Região das Américas para receber amostras humanas positivas para influenza aviária A/H5. O envio internacional e aéreo de amostras humanas para o Centro Colaborador do CDC deve estar em conformidade com todos os padrões internacionais, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), com documentos especiais necessários para o transporte para os Estados Unidos, diferentes dos documentos rotineiros para o envio de amostras de influenza sazonal. É importante observar que as amostras **não** devem ser submetidas ao CDC como amostras de influenza de rotina.

## Vigilância e diagnóstico laboratorial em animais

Os laboratórios veterinários nos países geralmente têm a capacidade de detectar e, até certo ponto, de tipificar o vírus em amostras sorológicas e moleculares. Uma recente rodada de testes de proficiência realizado pelo Laboratório de Referência Regional da OMSA em Campinas, São Paulo, Brasil, realizada em 2021 com o apoio da PANAFTOSA-OPAS/OMS, verificou uma boa aptidão dos laboratórios participantes para a realização de testes sorológicos diagnósticos (ELISA, HI e AGID) e moleculares (RT-qPCR) para se obter um diagnóstico final de influenza aviária. Essa rodada incluiu Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, além do Brasil como laboratório coordenador. Outros laboratórios de serviços veterinários participaram de outros ensaios de proficiência em 2022 com excelentes resultados, por exemplo, os desenvolvidos pelo laboratório de referência USDA OMSA, Ames, Iowa, EUA, dos quais participou o laboratório LADIVES do Panamá, ou coordenados pelo laboratório GD, como é o caso do SENASICA do México.

As estratégias de vigilância combinam o uso de técnicas sorológicas e moleculares para descartar não apenas a exposição prévia ao vírus, mas também a presença atual do vírus. Este último ponto é muito relevante para se conseguir uma detecção rápida. A subtipagem do vírus em aves procura principalmente descartar/verificar a presença dos vírus influenza A, H5 ou H7. Para o diagnóstico de outros subtipos, os laboratórios geralmente não têm os reagentes necessários. No entanto, essas análises que permitem diferenciar a presença de influenza aviária de alta patogenicidade são suficientes para subsidiar ações de campo. Observa-se a importância da coleta de tecido nervoso em amostras de campo durante o manejo de suspeitas em aves selvagens para otimizar a detecção de patógenos.

O laboratório de referência regional de Campinas está apoiando a confirmação de diagnósticos de países sul-americanos e a subtipagem. O sequenciamento total de vírus está sendo realizado com o apoio de outros laboratórios, incluindo o laboratório de referência OMSA do USDA em Ames, Iowa, EUA.

Os países estão com certa demanda por reagentes para técnicas moleculares, para dar continuidade às atividades de vigilância requeridas durante o controle de surtos encontrados em aves, particularmente na zona perifocal.

### Envio de amostras

Recomenda-se que amostras de animais detectados com o vírus sejam enviadas para teste e avaliação de sua inclusão no desenvolvimento de vacinas sazonais para humanos. Para essa finalidade, as amostras de animais devem ser enviadas ao Centro Colaborador da OMS no St. Jude Children's Hospital. São necessários documentos especiais para o transporte para os Estados Unidos e todos os requisitos internacionais devem ser atendidos.

Para mais informações sobre logística e envio de amostras A/H5 de influenza humana ou aviária, a OPAS/OMS deve ser contatada em [flu@paho.org](mailto:flu@paho.org).

## Sequenciamento e vigilância genômica

### Sequenciamento

A submissão de uma amostra positiva para influenza A/H5 animal ou humana ao Centro Colaborador da OMS **deve ser priorizada**, para caracterização antigênica e genômica da amostra.

Para os laboratórios que possuem capacidade de sequenciamento, além de enviar a amostra positiva para o Centro Colaborador, é recomendado sequenciar a amostra para gerar dados de sequenciamento genômico e fazer o *upload* das sequências em tempo hábil para a plataforma global GISAID.

A publicação de sequências no GISAID requer o uso da nomenclatura recomendada pela OMS (80):

- O formato para humanos é:  
[tipo de influenza]/[região]/[número de referência interno]/[ano de coleta]  
Ex.: A/Wisconsin/2145/2001
- Para todos os outros hospedeiros animais:  
[Tipo de Influenza]/[Hospedeiro]/[Região]/[Número de Referência Interno]/[ano de coleta].  
Ex.: A/chicken/Rostov/864/2007

## Vigilância Genômica

**Vírus da influenza A/H5 humana:** Desde o início de 2020, os vírus da influenza A/H5 notificados à OMS e detectados infectando seres humanos são do grupo genético 2.3.4.4b. As sequências de vírus desses casos humanos, quando disponíveis, não mostraram marcadores de adaptação em mamíferos ou resistência a antivirais, incluindo oseltamivir e baloxavir (81).

**Vírus da influenza A/H5 animal:** O clado 2.3.4.4b foi introduzido no final de 2021 na América do Norte por aves selvagens e se espalhou para a América Latina ao longo de 2022 e 2023. Os vírus da influenza aviária A (H5N1), especialmente os do grupo genético 2.3.4.4b, continuam a se diversificar geneticamente e a se propagar geograficamente. Além disso, a infecção em aves selvagens e migratórias tem levado a múltiplas incursões separadas em espécies domésticas. Essa circulação do vírus tem resultado em oportunidades de gerar múltiplos genótipos com sinais clínicos variados. Por meio do monitoramento de rotina e sequenciamento viral, foram encontradas poucas sequências com marcadores de adaptação a mamíferos. Essas mutações provavelmente ocorreram após a transmissão para o hospedeiro mamífero e não parecem ser transmitidas adiante. As sequências disponíveis para o grupo genético 2.3.4.4b de vírus de origem aviária e de mamíferos indicam que os marcadores associados à suscetibilidade reduzida aos antivirais são raros (81).

**Vírus candidatos a vacina contra a influenza zoonótica:** O Sistema Global de Vigilância e Resposta à Influenza (GISRS) da OMS, em colaboração com colegas veterinários e de saúde animal, avalia regularmente os vírus candidatos a vacina. Os vírus vacinais candidatos para vacina contra a influenza A/H5 do grupo genético 2.3.4.4b. estão determinados. Isso inclui um vírus candidato A/H5N8, na verdade, A/Astrakhan/3212/2020, bem como um vírus A/H5N1, A/chicken/Ghana/AVL76321VIR7050-39/2021. O vírus da vacina A/Astrakhan/3212/2020 está intimamente relacionado com as cepas circulantes de influenza A/H5 recentemente detectadas. (81).

## Fontes de informação

1. Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Influenza Aviária. Paris: OMSA; 2023 [citado em 3 de agosto de 2023]. Disponível em inglês em: <https://www.woah.org/es/enfermedad/influenza-aviar/> y <https://wahis.woah.org/#/event-management>
2. Organização Mundial de Saúde Animal. Influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) - Informe de situação 46. 21 de julho de 2023. Paris: OMSA; 2023. Disponível em inglês em: <https://www.woah.org/es/documento/high-pathogenicity-avian-influenza-hpai-situation-report-46/>
3. Organização Mundial da Saúde. Surtos contínuos de gripe aviária em animais representam um risco para os seres humanos. 12 de julho de 2023. Genebra: OMS; 2023. Disponível em inglês em: <https://www.who.int/news/item/12-07-2023-ongoing-avian-influenza-outbreaks-in-animals-pose-risk-to-humans>.
4. Organização Mundial da Saúde. Número cumulativo de casos humanos confirmados de influenza aviária A (H5N1) notificados à OMS, 2003-2023. 14 de julho de 2023. Genebra: OMS; 2023. Disponível em inglês em: [https://www.who.int/publications/m/item/cumulative-number-of-confirmed-human-cases-for-avian-influenza-a\(h5n1\)-reported-to-who--2003-2023-14-jul-2023](https://www.who.int/publications/m/item/cumulative-number-of-confirmed-human-cases-for-avian-influenza-a(h5n1)-reported-to-who--2003-2023-14-jul-2023).
5. Organização Mundial da Saúde. Influenza aviária A (H5N1) - Estados Unidos da América. 6 de maio de 2022. Genebra: OMS; 2022. Disponível em inglês em: [https://www.who.int/publications/m/item/cumulative-number-of-confirmed-human-cases-for-avian-influenza-a\(h5n1\)-reported-to-who--2003-2023-14-july-2023](https://www.who.int/publications/m/item/cumulative-number-of-confirmed-human-cases-for-avian-influenza-a(h5n1)-reported-to-who--2003-2023-14-july-2023)
6. Ministério de Saúde Pública do Equador. Autoridades sanitárias mantêm vigilância ativa para o caso da gripe aviária. 10 de janeiro 2022. Quito: MSP; 2022. Disponível em espanhol em: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=555571356609961&set=a.253584503475316>
7. Ministério de Saúde do Chile. MINSAL informa primeiro caso humano de influenza aviária no Chile. 29 de março de 2023. Santiago: MINSAL; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.minsal.cl/minsal-informa-primer-caso-humano-de-gripe-aviar-en-chile/>
8. Ministério da Saúde da Argentina. O Ministério da Saúde da Nação emite recomendações devido à detecção de um caso de gripe aviária em uma ave selvagem em Jujuy. 15 de fevereiro 2023. Buenos Aires: Ministério da Saúde da Argentina; 2023. Nota de prensa. Disponível em espanhol em: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-salud-de-la-nacion-emite-recomendaciones-ante-la-deteccion-de-un-caso-de>
9. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) Argentina. Influenza Aviária: Novos casos em aves de quintal em Buenos Aires, Córdoba, Río Negro e San Luis. 25 de fevereiro 2023. Córdoba: SENASA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/influenza-aviar-nuevos-casos-en-aves-de-traspatio-en-buenos-aires-cordoba-rio-negro-y-san>
10. Ministério da Saúde da Argentina. Boletim Epidemiológico Nacional, semana epidemiológica 14. Situação da influenza aviária na Argentina. Número 648. Abril de 2023. Disponível em espanhol em: <https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-epidemiologico-nacional-n-648-se-14-2023>

11. Senasa Argentina. Influenza aviária: Primeiro caso positivo confirmado em aves de criação no Rio Negro. 28 de fevereiro de 2023. Córdoba: SENASA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/influenza-aviar-se-confirmando-el-primer-caso-positivo-en-aves-de-corral-en-rio-negro>
12. Senasa Argentina. Influenza aviária: Estado da Situação epidemiológica na Argentina. Consultado em 12 de maio de 2023. Córdoba: SENASA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.argentina.gob.ar/senasa/influenza-aviar>
13. Serviço Nacional de Saúde Agropecuária e Segurança Alimentar. Resolução administrativa SENASAG Nº 10/2023. 27 de janeiro 2023. La Paz: SENASAG; 2023. Disponível em espanhol em: [https://www.senasag.gob.bo/phocadownload/RESOLUCIONES\\_ADMINISTRATIVAS/RESOLUCIONES\\_ADMINISTRATIVAS/SANIDAD\\_ANIMAL/2023/RA\\_10\\_2023.pdf](https://www.senasag.gob.bo/phocadownload/RESOLUCIONES_ADMINISTRATIVAS/RESOLUCIONES_ADMINISTRATIVAS/SANIDAD_ANIMAL/2023/RA_10_2023.pdf)
14. SENASAG. Plano da SENASAG para erradicar a Influenza Aviária no país foi revisado por especialistas da FAO e está em conformidade com todos os parâmetros internacionais. 23 de fevereiro. Cochabamba; SENASAG; 2023. Nota de imprensa. Disponível em espanhol em: <https://www.senasag.gob.bo/index.php/comunicacion/noticias/375-plan-del-senasag-para-erradicar-influenza-aviar-en-el-pais-fue-revisado-por-expertos-de-la-fao-y-cumple-con-todos-los-parametros-internacionales>
15. Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) do Brasil. Brasil registra caso de gripe aviária em aves silvestres, MAPA alerta para cuidados. 15 de maio de 2023. Brasília: MAPA; 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/brasil-registra-caso-de-gripe-aviaria-em-aves-silvestres-mapa-alerta-para-cuidados>
16. Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) do Brasil. Influenza Aviária. Brasília: MAPA; 2023. [Consultado em 3 de agosto 2023]. Disponível em: [https://mapa-indicadores.agricultura.gov.br/publico/extensions/SRN\\_v2\\_ES/SRN\\_v2\\_ES.html](https://mapa-indicadores.agricultura.gov.br/publico/extensions/SRN_v2_ES/SRN_v2_ES.html)
17. Governo do Canadá. Status da resposta contínua à influenza aviária por província. Ottawa: Gobierno de Canadá; 2023 [citado em 3 de agosto 2023]. Disponível em inglês em: <https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/diseases/reportable/avian-influenza/latest-bird-flu-situation/status-of-ongoing-avian-influenza-response/eng/1640207916497/1640207916934#wb-auto-17>
18. Cooperativa Canadense de Saúde da Fauna Silvestre. AIV - Relatórios quinzenais. Ottawa: CWHC; 2023 [Consultado em 3 de agosto 2023]. Disponível em inglês em: [http://www.cwhc-rcsf.ca/avian\\_influenza\\_biweekly\\_reports.php](http://www.cwhc-rcsf.ca/avian_influenza_biweekly_reports.php)
19. Ministério da Agricultura do Chile. O Ministro Valenzuela confirma o primeiro caso de gripe aviária H5N1 em aves selvagens encontradas em Arica. 7 de dezembro de 2022. Santiago: MINAGRI; 2022. Disponível em espanhol em: <https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministro-valenzuela-confirma-primer-caso-de-influenza-aviar-h5n1-en-ave-silvestre-encontrada-en-arica/>
20. Ministerio de Agricultura de Chile. SAG confirma um caso positivo de gripe aviária na região de O'Higgins. 6 de janeiro de 2023. Santiago: MINAGRI; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.minagri.gob.cl/noticia/sag-confirma-caso-positivo-a-influenza-aviar-en-region-de-ohiggins/>

21. Ministério da Agricultura do Chile. SAG Los Lagos confirma o primeiro caso de influenza aviária em aves silvestres. 11 de fevereiro 2023. Santiago: MINAGRI; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.sag.gob.cl/noticias/sag-los-lagos-confirma-primer-caso-de-influenza-aviar-en-aves-silvestres>
22. Organização Mundial de Saúde Animal. Chile Influenza A altamente patogênica (inf. por vírus de IA) (aves que não sejam aves de criação, incluindo aves silvestres) (2017-). Paris: OMSA; 2023 [Consultado em 3 de agosto de 2023]. Disponível em inglês em: <https://wahis.woah.org/#/in-event/4775/dashboard>
23. Ministerio de Agricultura de Chile. SAG controla caso de influenza aviária em aves de quintal não comerciais na região do Atacama 2023. Santiago: MINAGRI; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.sag.gob.cl/noticias/sag-controla-caso-de-influenza-aviar-en-aves-de-traspasio-no-comercial-en-la-region-de-atacama>
24. Serviço Nacional de Pesca e Acuicultura. SERNAPESCA informa primeiro caso de Gripe Aviária na espécie Lontra felina, popularmente conhecida como chungungo. 7 de março de 2023. Santiago: SERNAPESCA; 2023. Disponível em espanhol em: <http://www.sernapesca.cl/noticias/sernapesca-informa-primer-caso-de-influenza-aviar-en-especie-lontra-felina-popularmente>
25. Serviço Agrícola e Pecuário. Influenza aviária. Santiago: SAG; 2023 [Consultado em 3 de agosto de 2023]. Disponível em espanhol em: [https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/influenza-aviar-publicaciones?field\\_tema\\_otros\\_documentos\\_target\\_id=All&field\\_tipo\\_de\\_publicacion\\_target\\_id=247&field\\_fecha\\_otros\\_value=&title=](https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/influenza-aviar-publicaciones?field_tema_otros_documentos_target_id=All&field_tipo_de_publicacion_target_id=247&field_fecha_otros_value=&title=)
26. Serviço Agrícola e Pecuário. Base de dados Influenza aviária IAAP. Santiago: SAG; 2023 [Consultado em 3 de agosto de 2023]. Disponível em espanhol em: <https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/influenza-aviar-ia>
27. Serviço Nacional de Pesca e Aquicultura. Situação da Influenza Aviária. Santiago: SERNAPESCA; 2023 [Consultado em 3 de agosto de 2023]. Disponível em espanhol em: <http://www.sernapesca.cl/influenza-aviar#:~:text=En%20estos%20momentos%20las%2016.com%C3%BAn%20en%20la%20regi%C3%B3n%20Antofagasta>
28. Serviço Nacional de Pesca e Aquicultura. SERNAPESCA reforça sua governança na gestão da gripe aviária para o segundo semestre 2023. 2 de agosto de 2023. Santiago: SERNAPESCA; 2023. Disponível em espanhol em: <http://www.sernapesca.cl/noticias/sernapesca-refuerza-su-gobernanza-en-la-gestion-de-la-influenza-aviar-de-cara-al-segundo>
29. Organização Mundial de Saúde. Infecção humana causada por influenza aviária (H5N1) – Chile. 21 de abril de 2023. Genebra: OMS; 2023. Disponível em inglês em: <https://www.who.int/es/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON461>
30. Ponto Focal Nacional para Regulamento Sanitário Internacional (RSI) de Chile. Relatório recebido por correio eletrônico em 20 de julho 2023. Santiago; 2023. Inédito.
31. Instituto Colombiano de Agricultura (ICA). Balanço da situação sanitária devido à gripe aviária de alta patogenicidade no país. 27 de fevereiro de 2023. Bogotá: ICA; 2023.

Disponível em espanhol em: <https://www.ica.gov.co/noticias/ica-bolivar-balance-sanitario-influenza-aviar#:~:text=Bogot%C3%A1%20D.C.%2025%20de%20febrero%20de%202023.&text=Tra s%20un%20trabajo%20articulado%20entre, inicial%20ubicado%20en%20El%20Tambo>.

32. Instituto Colombiano de Agricultura (ICA). Surto de gripe aviária altamente patogênica é confirmado na ilha de Gorgona. 1º de março de 2023. Bogotá: ICA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.ica.gov.co/noticias/ica-confirma-influenza-aviar-isla-gorgona>
33. Instituto Colombiano de Agricultura (ICA). Colômbia avança no controle da influenza aviária. 19 de abril de 2023 Bogotá: ICA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.ica.gov.co/noticias/colombia-avanza-control-influenza-aviar>
34. Instituto Colombiano de Agricultura (ICA). Colômbia erradica todos os focos de gripe aviária. 5 de maio de 2023. Bogotá: ICA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.ica.gov.co/noticias/colombia-erradica-totalidad-focos-influenza-aviar>
35. Ponto Focal Nacional (PFN) para o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) da Colômbia. Relatório por e-mail recebido em 23 de maio de 2023. Bogotá; 2023. Inédito.
36. Instituto Colombiano de Agricultura. ICA intervém em novo surto de gripe aviária em aves silvestres. 18 de julho de 2023. Bogotá: ICA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.ica.gov.co/noticias/ica-interviene-foco-influenza-aviar-ave-silvestre>
37. Ponto Focal Nacional (PFN) para o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) da Colômbia. Relatório de e-mail recebido em 18 de julho de 2023. Bogotá; 2023. Inédito.
38. Instituto Colombiano de Agricultura. Novo surto de influenza aviária altamente patogênica em aves silvestres, detectado pelo ICA no departamento de Cauca. 28 de julho de 2023. Bogotá: ICA; 2023. Disponível em espanhol em: [https://www.ica.gov.co/noticias/nuevo-foco-de-influenza-aviar-de-alta-patogenicidad?fbclid=IwAR37D2JGSwAY9CnGVK0Gp0jtLp9v6xBsfSYivsQTL\\_4ezC3V\\_PJmlxgykdk](https://www.ica.gov.co/noticias/nuevo-foco-de-influenza-aviar-de-alta-patogenicidad?fbclid=IwAR37D2JGSwAY9CnGVK0Gp0jtLp9v6xBsfSYivsQTL_4ezC3V_PJmlxgykdk)
39. Ponto Focal Nacional (PFN) para o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) da Colômbia. Relatório de e-mail recebido em 1º de agosto de 2023. Bogotá; 2023. Inédito.
40. Serviço Nacional de Saúde Animal. SENASA confirma primeros casos de Influenza Aviar en aves silvestres en territorio nacional. 24 de janeiro de 2023. San José: SENASA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.senasa.go.cr/informacion/noticias/515-senasa-confirma-primeros-casos-de-influenza-aviar-en-aves-silvestres-en-territorio-nacional>
41. SENASA. Senasa detecta dois novos surtos de gripe aviária em aves silvestres e um em aves domésticas. 2 de fevereiro de 2023. San José: SENASA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.senasa.go.cr/informacion/noticias/516-senasa-detecta-dos-nuevos-focos-de-influenza-aviar-en-aves-silvestres-y-uno-en-domesticas>
42. Serviço Nacional de Saúde Animal MAG Costa Rica. Boletim Epidemiológico Extraordinário. 27 de fevereiro de 2023. San José: SENASA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/estado-sanitario/boletines-epidemiologicos-extraordinarios>



43. Serviço Nacional de Saúde Animal. Executivo assina declaração de emergência sanitária nacional para prevenção, controle e erradicação da gripe aviária. 29 de março de 2023. San José: SENASA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.senasa.go.cr/informacion/noticias/529-ejecutivo-firma-declaratoria-de-emergencia-sanitaria-nacional-para-prevencion-control-y-erradicacion-de-la-influenza-aviar>
44. Ministério da Agricultura (MINAG). Cuba declara a presença de gripe aviária em aves selvagens. 7 de fevereiro de 2023. Habana: MINAG; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.minag.gob.cu/noticias/nota-informativa-a-la-poblacion/>
45. Ministério da Agricultura. Atualização à população sobre o evento da gripe aviária no jardim zoológico de Havana. 10 de fevereiro de 2023. Habana: MINAG; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.minag.gob.cu/noticias/actualizacion-a-la-poblacion-sobre-el-evento-de-influenza-aviar-en-el-jardin-zoologico-de-la-habana/>
46. OMSA. WAHIS-Cuba - Influenza A de alta patogenicidade (inf. por vírus de Ia) (aves que não sejam de granja, incluindo aves silvestres) (2017-) - Relatório de acompanhamento. Habana: OMSA; 2023 [consultado em 3 de agosto de 2023]. Disponível em inglês em: <https://wahis.woah.org/#/in-review/4895?fromPage=event-dashboard-url>
47. Ministério da Agricultura e Pecuária do Equador. Comunicado: MAG e Agroqualidade ativam cerco epidemiológico e controlam primeiro caso de gripe aviária. 27 de novembro de 2022. Quito: MAG; 2022. Disponível em espanhol em: <https://www.agricultura.gob.ec/mag-y-agrocalidad-activan-cerco-epidemiologico-y-controlan-primer-caso-de-influenza-aviar/>
48. Ministério da Agricultura e Pecuária do Equador. Comunicado: 180 mil aves foram desativadas cumprindo os procedimentos técnicos em Cotopaxi. 4 de dezembro de 2022. Quito: MAG; 2022. Disponível em espanhol em: <https://www.agricultura.gob.ec/180-mil-aves-se-dieron-de-baja-cumpliendo-procedimientos-tecnicos-en-cotopaxi/>
49. Agência de Regulação e Controle Fitossanitário. Comunicado de imprensa: MAG e AGROCALIDAD reforçam medidas para conter novos casos de gripe aviária. 9 de janeiro de 2023. Quito: AGROCALIDAD; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.agrocalidad.gob.ec/mag-y-agrocalidad-refuerzan-medidas-para-contener-nuevos-casos-de-influenza-aviar/>
50. Ministério da Agricultura e Pecuária do Equador. Comunicado: MAG anuncia a prorrogação da validade do estado de emergência sanitária, para conter a gripe aviária, até 27 de maio de 2023. 27 de fevereiro de 2023. Quito: MAG; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.facebook.com/photo?fbid=578646200963328&set=a.247582040736414>
51. Agência de Regulação e Controle Fitossanitário. Comunicado de imprensa: Com quatro milhões de doses de vacinas contra a gripe aviária. 3 de março de 2023. Quito: AGROCALIDAD; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.facebook.com/agrocalidadecuador/photos/a.1390105871210004/3391795247707713>
52. Agência de Regulamentação e Controle de Saúde Zoossanitária e Vegetal. Comunicado oficial. 30 de julho de 2023. Quito: AGROCALIDAD; 2023. Disponível em espanhol em: [https://twitter.com/AgrocalidadEC/status/1685729843873259520?ref\\_src=twsrc%5Etfw%7Ct](https://twitter.com/AgrocalidadEC/status/1685729843873259520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct)

[wcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AAgrocalidadEC%7Ctwcon%5Es](#)

53. Centros dos EUA para Controle de Doenças (US CDC). Informações sobre a influenza em aves. Atlanta, GA: CDC; 2023 [consultado em 2 agosto 2023]. Disponível em inglês em: <https://espanol.cdc.gov/flu/avianflu/avian-flu-summary.htm>
54. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Serviço de Inspeção Animal e Vegetal. 2022-2023 Detecções de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em Mamíferos. Washington, DC: USDA; 2023 [consultado em 2 agosto 2023]. Disponível em inglês em: <https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-disease-information/avian/avian-influenza/hpai-2022/2022-hpai-mammals>
55. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Alimentação (MAGA). Ministério da Guatemala redobra as medidas sanitárias antes da confirmação de um caso de Gripe Aviária de Alta Patogenicidade H5N1 em Izabal. 14 de fevereiro de 2023. Guatemala: MAGA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.maga.gob.gt/guatemala-redobla-medidas-sanitarias-ante-la-confirmacion-de-un-caso-de-influenza-aviar-de-alta-patogenicidad-h5n1-en-izabal/#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Agricultura,%20Ganader%C3%ADa,de%20Puerto%20Barrios,%20departamento%20de>
56. OMSA. WAHIS - Guatemala - Influenza A de alta patogenicidade (inf. por vírus de Ia) (que não sejam aves de granja, incluindo aves selvagens) (2017-). Paris: OMSA; 2023 [consultado em 2 agosto 2023]. Disponível em inglês em: <https://wahis.woah.org/#/in-event/4903/dashboard>
57. Secretaria de Agricultura e Pecuária de Honduras. Comunicado N°1: O Serviço Nacional de Saúde e Segurança Alimentar (SENASA), toma medidas sanitárias para encontrar Influenza Aviária em aves selvagens. 4 de janeiro de 2023. Honduras: SAG; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.prensa.sag.gob.hn/2023/01/04/comunicado-001-2023/>
58. Secretário de Agricultura e Pecuária de Honduras. Comunicado N°4. 2 de janeiro 2023. Honduras: SAG; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.prensa.sag.gob.hn/2023/01/09/comunicado-sag-004-2023/>
59. Secretário de Agricultura e Pecuária de Honduras. SAG-SENASA mantém vigilância permanente nas praias da costa atlântica. 10 de janeiro de 2023. Honduras: SAG; 2023. Disponível em espanhol em <https://www.prensa.sag.gob.hn/2023/01/10/%F0%9F%9A%A8-sag-senasa-mantiene-vigilancia-permanente-en-playas-de-la-costa-atlantica/>
60. Governo do México. Vacinação estratégica para proteger a produção avícola nacional. 11 de novembro 2023. Ciudad de México: Gobierno de México; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.gob.mx/senasica/articulos/vacunacion-estrategica-para-proteger-la-produccion-avicola-nacional>
61. Governo do México. Início de 2023 sem surtos ativos de influenza aviária AH5N1 no país: Agricultura. 5 de janeiro de 2023. Cidade do México: Governo do México; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.gob.mx/senasica/prensa/levanta-agricultura-cuarentena-a-la-avicultura-de-jalisco>
62. Governo do México. Agricultura de quarentena retira avicultura em Yucatán; nenhum surto ativo de gripe aviária AH5N1 no México. 10 de fevereiro de 2023. Ciudad de México:

- Gobierno de México; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.gob.mx/pronabive/prensa/refira-agricultura-cuarentena-a-la-avicultura-de-yucatan-sin-focos-activos-de-influenza-aviar-ah5n1-en-mexico-326001>
63. Gobierno de México. Identificou influenza aviária AH5N1 em Aguascalientes. 2 de março de 2023. Ciudad de México: Gobierno de México; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.gob.mx/senasica/articulos/identifican-influenza-aviar-ah5n1-en-aguascalientes?idiom=es>
64. Ministério do Desenvolvimento Agropecuário do Panamá. As medidas de vigilância MIDA detectam o segundo caso de gripe aviária: MIDA; 2023 [consultado em 2 agosto 2023]. Disponível em espanhol em: <https://mida.gob.pa/medidas-de-vigilancia-del-mida-detectan-segundo-caso-de-la-gripe-aviar/?csrt=17283806897402428950>
65. Ministério do Desenvolvimento Agrícola do Panamá. Equipe interinstitucional visita Veraguas para casos de gripe aviária. Ciudad de Panamá: MIDA; 2022 [consultado em 2 agosto 2023]. Disponível em espanhol em: <https://mida.gob.pa/equipo-interinstitucional-visita-veraguas-por-casos-de-influenza-aviar/?csrt=7844533002902810429>
66. Organização Mundial de Saúde Animal. WAHIS - Panamá - Influenza A de alta patogenicidade (inf. por vírus de Ia) (que não sejam aves de granja, incluindo aves selvagens) (2017-) - Relatório de acompanhamento 14. Paris: OMSA; 2023 [citado el 2 agosto 2023]. Disponível em inglês em: <https://wahis.woah.org/#/in-review/4789?fromPage=event-dashboard-url>
67. Serviço Nacional de Saúde Agrária do Peru (SENASA). Comunicado: SENASA declara alerta sanitário para a gripe aviária H5N1 em aves selvagens. 24 de novembro 2022. Lima: SENASA; 2022. Disponível em espanhol em: <https://www.gob.pe/institucion/senasa/noticias/673837-senasa-declara-alerta-sanitaria-por-influenza-aviar-h5n1-en-aves-silvestres>
68. Serviço Nacional de Saúde Agrária do Peru (SENASA). Comunicado. SENASA mantém sob controle os casos de gripe aviária em aves domésticas. 29 de novembro de 2022. Lima: SENASA; 2022. Disponível em espanhol em: <https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/senasa-mantiene-bajo-control-casos-de-influenza-aviar-en-aves-domesticas/>
69. Serviço Nacional de Saúde Agrária do Peru (SENASA). Peru: Peru mantém surtos de gripe aviária sob controle. 16 de dezembro de 2022. Lima: SENASA; 2022. Disponível em espanhol em: <https://www.gob.pe/institucion/senasa/noticias/680633-senasa-peru-mantiene-bajo-control-brotes-de-influenza-aviar>
70. Serviço Nacional de Saúde Agrária do Peru. Comunicado de imprensa: Emergência de saúde devido à gripe aviária em aves domésticas expande. 25 de fevereiro de 2023. Lima: SENASA; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.gob.pe/institucion/senasa/noticias/718610-se-amplia-emergencia-sanitaria-por-influenza-aviar-en-aves-domesticas>
71. Ministério da Saúde do Peru (Minsa). Centro Nacional de Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças. Investigación e Controle do Surto de Influenza Aviária na Região de Saúde de Cajamarca e Junín. Lima: MINSA; 2023 [citado el 2 agosto 2023]. Disponível em espanhol em: <http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/teleconferencia/2023/SE052023/03.pdf>

72. Ministério da Saúde do Peru (Minsa). Centro Nacional de Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças. Sala de Influenza Aviária Peru. Lima: MINSA; 2023 [citado em 2 agosto 2023]. Disponível em espanhol em: <https://www.dge.gob.pe/influenza-aviar-ah5/>
73. Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai. Comunicado de imprensa: Gripe aviária. 15 de fevereiro de 2023. Montevideo: MGAP; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/comunicado-prensa-influenza-aviar>
74. Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai. Comunicado de imprensa – Atualização. 3 de março de 2023. Montevideo: MGAP; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/comunicado-prensa-actualizacion-332023>
75. Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai. Influenza Aviária – Comunicado de imprensa – Atualização. 17 de abril de 2023. Montevideo: MGAP; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/noticias/influenza-aviar-comunicado-prensa-actualizacion-17042023>
76. Organização Mundial de Saúde Animal. WAHIS. Uruguai - Influenza A de alta patogenicidade (inf. por vírus de Ia) (que não sejam aves de granja, incluindo aves selvagens) (2017-) - Notificação imediata. Paris: OMSA; 2023 [consultado em 2 agosto 2023]. Disponível em espanhol em: <https://wahis.woah.org/#/in-review/4947?fromPage=event-dashboard-url>
77. Ministério do Poder Popular para a Agricultura Produtiva e Terras da Venezuela. 29 de novembro de 2022. Caracas: MPPCT; 2022. Disponível em espanhol em: <http://certificados.insai.gob.ve/app/inicio/urgente.pdf>
78. Ministério do Poder Popular para a Ciência e Tecnologia da Venezuela. Declaração Gripe aviária. 12 de dezembro de 2022 Caracas: MPPCT; 2022 [consultado em 11 janeiro 2023]. Disponível em espanhol em: <https://bit.ly/3FqYfFH>
79. Organização Mundial de Saúde Animal. WAHIS. Sistema Global de Informação em Saúde Animal - Relatório Venezuela - Influenza de alta patogenicidade tipo A. Paris: MSA; 2023 [consultado em 2 agosto 2023]. Disponível em espanhol em: <https://wahis.woah.org/#/in-review/4760?fromPage=event-dashboard-url>
80. Organização Mundial de Saúde. Protocolo para a investigação da gripe não sazonal e de outras doenças respiratórias agudas emergentes. 2 de outubro de 2018. Genebra: OMS; 2018. Disponível em espanhol em <https://apps.who.int/iris/handle/10665/329895>
81. Organização Mundial de Saúde. Estratégia global contra a gripe 2019-2030. 15 de março de 2019. Genebra: OMS; 2019. Disponível em inglês em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241515320>
82. Organização Mundial de Saúde. Reunião do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização, abril de 2009: recomendações sobre o uso de vacinas autorizadas contra a influenza humana H5N1 no período interpandêmico. 12 de junho de 2009. Genebra: OMS; 2009. Disponível em inglês em: <https://www.who.int/publications/i/item/WER8424>
83. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Fluxo de amostras e algoritmo de testes laboratoriais: amostras de pacientes suspeitos de influenza A/H5. 14 outubro 2022.

Washington, DC: OPS; 2022. Disponível em espanhol em: <https://www.paho.org/es/documentos/vigilancia-integrada-influenza-sars-cov-2-algoritmo-pruebas-laboratorio>

84. Organização Mundial de Saúde. Regulamento Sanitário Internacional de 2005. 3ª Edição. Amostras coletadas fora da vigilância de rotina em eventos de interesse de saúde pública 1 de janeiro 2026. Genebra: OMS; 2016. Disponível em espanhol em: <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241580496>
85. Organização Pan-Americana da Saúde. Vigilância integrada de influenza e SARS-CoV-2 - algoritmo de teste laboratório. 14 de outubro de 2022. Washington, DC: OPS; 2022. Disponível em espanhol em: <https://www.paho.org/es/documentos/vigilancia-integrada-influenza-sars-cov-2-algoritmo-pruebas-laboratorio>
86. Organização Pan-Americana da Saúde. Nota técnica: Nomenclatura do vírus Influenza. 11 de janeiro de 2023. Washington, DC: OPS; 2023. Disponível em espanhol em: <https://www.paho.org/es/documentos/nota-tecnica-nomenclatura-virus-influenza>
87. OMS. Avaliação dos riscos associados aos vírus influenza A (H5N1) recentes no clado 2.3.4.4b. 21 de dezembro de 2022. Disponível em inglês em: [https://www.who.int/publications/m/item/assessment-of-risk-associated-with-recent-influenza-a\(h5n1\)-clade-2.3.4.4b-viruses](https://www.who.int/publications/m/item/assessment-of-risk-associated-with-recent-influenza-a(h5n1)-clade-2.3.4.4b-viruses)

## Links úteis

- Organização Mundial de Saúde. Resumo das principais informações: práticas para países com surtos de gripe aviária A(H5N1) e outros subtipos, primeira edição. Julho 2026. Genebra; OMS; 2016. Disponível em inglês em <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246251/WHO-OHE-PED-GIP-EPI-2016.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Organização Mundial de Saúde. Programa Global de Influenza: Preparando-se para uma Pandemia de Influenza. Genebra: OMS; 2023 [consultado em 2 agosto 2023]. Disponível em inglês em: <https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/public-health-preparedness>
- Organização Mundial de Saúde. Virus de la gripe aviar y otros virus de la gripe de origen zoonótico. 13 de noviembre 2018. Genebra: OMS; 2018. Disponível em espanhol: [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(avian-and-other-zoonotic\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(avian-and-other-zoonotic))
- Organização Mundial de Saúde. Fortalecimento da segurança sanitária global na interface homem-animal. Genebra: OMS; 2023 [consultado em 2 agosto 2023]. Disponível em inglês em: <https://www.who.int/activities/strengthening-global-health-security-at-the-human-animal-interface>
- Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Atualização sobre a situação global dos vírus da influenza aviária com potencial zoonótico. 22 de junho de 2023. Rome: FAO; 2023. Disponível em inglês em: <https://www.fao.org/animal-health/situation-updates/global-aiv-with-zoonotic-potential/en> <https://bit.ly/3hZOW7y>
- Organização Mundial de Saúde. Avaliação dos riscos associados aos vírus influenza A (H5N1) recentes no clado 2.3.4.4b. 21 de dezembro de 2022. Genebra: OMS; 2022. Disponível

em inglês em: [https://www.who.int/publications/m/item/assessment-of-risk-associated-with-recent-influenza-a\(h5n1\)-clade-2.3.4.4b-viruses](https://www.who.int/publications/m/item/assessment-of-risk-associated-with-recent-influenza-a(h5n1)-clade-2.3.4.4b-viruses)

- Organização Mundial de Saúde Animal. Declaração sobre a gripe aviária e os mamíferos. 13 de fevereiro de 2023. Paris: OMSA; 2023. Disponível em espanhol: <https://www.woah.org/es/declaracion-sobre-la-influenza-aviar-y-los-mamiferos/>
- Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial de Saúde. Alertas e atualizações epidemiológicas. Gripe aviária. Washington DC: OPS/OMS; 2023 [consultado em 2 de agosto de 2023]. Disponível em espanhol: [https://www.paho.org/es/alertas-actualizaciones-epidemiologicas?topic=63069&d\[min\]=&d\[max\]=](https://www.paho.org/es/alertas-actualizaciones-epidemiologicas?topic=63069&d[min]=&d[max]=)
- Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial de Saúde. Influenza na interface humano-animal. Recomendações da OPAS para fortalecimento do trabalho intersectorial na vigilância, detecção precoce e investigação, 9 de julho de 2020. Washington DC: OPS/OMS; 2020. Disponível em inglês em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/52562>
- Organização Mundial de Saúde. Resumo e avaliação da influenza na interface humano-animal, 5 de outubro de 2022. Genebra: OMS; 2022. Disponível em inglês em: <https://www.who.int/publications/m/item/influenza-at-the-human-animal-interface-summary-and-assessment-5-oct-2022>
- Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial de Saúde. Atualização Epidemiológica Surtos de gripe aviária e as implicações para a saúde pública na Região das Américas - 14 de dezembro de 2022. Washington DC: OPS/OMS; 2022. Disponível em espanhol: <https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-brotes-influenza-aviar-implicaciones-para-salud-publica>